

Suspensión concentrada para tratar semillas (FS) Imidacloprid + Tebuconazole (233 g/L + 13 g/L) Tratamiento de Semilla Ingestión y Contacto - Acción Sistémico uso agrícola Registro Nacional No. 342





### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:
Imidacloprid + Tebuconazole (233 g/L + 13 g/L)
Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 litro

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Prevenir el derrame de semillas tratadas y que queden disponibles para aves y otros animales. Cubrir bien las semillas sembradas. CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

AGÍTESE ANTES DE USAR.

ANCLA® FS es un insecticida y fungicida, para tratamiento de semillas, que afecta el sistema nervioso central de los insectos e inhibe la biosíntesis del ergosterol en los patógenos.

| CULTIVO | PLAGA  | DOSIS                      | ¹P.C. | <sup>2</sup> P.R. |
|---------|--|----------------------------|-------|-------------------|
| ARROZ   | Sogata Tagosodes orizicolus (vector del virus – VHBA)  Complejo patógenos del suelo: Penicillium sp., Fusarium sp., Sclerotium sp. | 2.5 – 3.0 ml/kg de semilla | N.A.  | N.A.              |
|         | Penicillium sp., Fusarium sp., Sclerotium sp.  |                            |       |                   |
|         | Cucarro<br>Euetheola bidentata   | 2.5 ml/kg de semilla       |       |                   |

N.A.: No aplica

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

ANCLA® FS es un producto para tratamiento de semillas, el cual debe ser utilizado dentro de un programa de Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y de cultivo.

Para lograr una buena cobertura de la semilla con el producto, se recomienda utilizar la dosis de ANCLA® FS /100 Kilos de semilla diluida en 1 litro de agua. (10 ml /Kg semilla).

### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

ANCLA® FS en las dosis y de la forma de aplicación recomendada, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>P.C: Periodo de Carencia: No aplica por ser tratamiento de semilla

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>P.R: Periodo de re-entrada: No aplica por ser tratamiento de semilla.

# IIIIII FICHA TÉCNICA





### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

PELIGROSO SI ES INHALADO, NO RESPIRE (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN).

- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y al aplicar el producto (guantes, botas, visor, overol, delantal); y al manipular la semilla tratada utilice guantes.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- No permita animales en el área donde se realiza el tratamiento de semilla.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.

# MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Es un tratamiento de semillas y debe utilizarse los equipos apropiados no debe aplicarse directo al cultivo de forma terrestre ó aérea.
- Siempre que trate la semilla mantenga una franja mínima de seguridad de 10 metros con los cuerpos de agua o cualquiera otra área que requiera protección especial.
- Aún cuando la formulación no representa un riesgo de exposición, Imidacloprid es tóxico para abejas.
- Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.

## EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12. LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

