









# SOLUCIONES BAYER PARA EL CULTIVO DE CÍTRICOS

 Brotación	 Floración	 Caída de pétalos	 Amarre de frutos	 Cambio de color	 Cosecha
0 días	70 días	110 días	140 días	220 días	240 - 250 días

## Control      Producto

Malezas  Zacate cola de zorra - <i>Lepochloa virgata</i> / Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> / Quelite <i>Amaranthus hybridus</i> / Anisillo <i>Mollugo verticillata</i> / Rodilla de pollo <i>Boerhavia erecta</i>		→			
Ninfas de Psílido de los cítricos <i>Diaphorina citri</i>		→	→		
Psílido Asiático <i>Diaphorina citri</i>		→	→		
Mancha Grasienta <i>Mycosphaerella citri</i>		→			
Antracnosis <i>Colletotrichum acuatatum</i>		→			
Ninfas y adultos de Psílido Asiático <i>Diaphorina Citri</i>		→			
Psílido asiático <i>Diaphorina Citri</i>		→			
Gomosis <i>Phytophthora parasitica</i>		→			

**CÍTRICOS  
MÁS RICOS**

**INSECTICIDAS**

**FUNGICIDAS**



Representación de la venta de aplicación de los productos del portafolio Bayer® para el cultivo de cucurbitáceas. La información aquí presentada es de carácter técnico e informativo. El uso de los productos puede variar acorde a las zonas y condiciones ambientales. Para la preparación y aplicación de estos productos refiérase a las instrucciones y recomendaciones indicadas en la etiqueta de cada producto. Bayer® y el portafolio representado son marcas registradas de Grupo Bayer. D.R. Bayer, México 2022.